

Nikdy nebud' zaskočen... aneb proč se stále opakovat?

MUDr. Michal Otáhal, Ph.D.

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
1. lékařská fakulta UK a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
U nemocnice 2, Praha 2



1. LÉKAŘSKÁ
FAKULTA
Univerzita Karlova



VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ
NEMOCNICE V PRAZE

PAVEL a MICHAL





Pavel Herda

Sdíleno veřejně - 14. 4. 2014

Se všemi , kdo chtějí opravdově a plnohodnotně žít a naplnit slovo život a hledají na to recept , jako my vsichni, se chci podělit o jeden důležitý... Jsou náhody , které přináší poznání Jsou to náhody? :-)))

Proč se opakovat?

Protože opakování je matka moudrosti a zručnosti!

**A až to VŠICHNI BUDOU UMĚT jako my
TAK my s tím MUŽEME PŘESTAT**

Zajištění DC

- 5 dní **postupně narůstající otok obličeje**
- u stomatologa nebyl, toho navštěvuje po
bolestech, nyní vyhledal pomoc na Stom



Zajištění DC



VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ
NEMOCNICE V PRAZE

KARIM
1.LF UK A VFN V PRAZE

- pro **inter-incizivální vzdálenosti cca 1cm** v analgosedaci za spont. ventilace pro otok velice obtížně

fibrobronchoskopická NTI





NTI - > OTI (pomocí FOB)

- **provedena** extrakce zubů 36, 37 + **zevní incize a kontraincize submandibulárního abscesu**
- **pro obtížné zajištění DC překlad na RES UP**
- překlad via CT: **prosáknutí a edém drénovaných oblastí submandibulárně, pterygomandibulárně a massetericky; edém podkožního tuku levé poloviny krku a obličeje**
- **zjevné kolekce charakteru abscesů nejsou; tuk v mediastinu mírně zastřený, nicméně obraz není zcela specifický pro mediastinitidu**





NTI - > OTI (pomocí FOB)

- po příjmu NTI/UPV, oběhově stabilní, **nutná vysoká dávka analgosedace**
- pro NTI 6,5 a předpoklad déleodobější nutnosti zajištění dýchacích cest při masivním otoku:
- přes fibrobronchoskop za pomoci videolaryngoskopu



reintubace OTK 8,5 + zavedena NGS



RES UP KARIM

- 25.3. v kontaktu při **VYSOKÉ DÁVCE** sedace k toleranci OTK (SUFNT 50ug/h + Propofol 500mg/h)
- **autoextubace OTI**
- **reintubace neúspěšná** (**NEDOSTUPNOST VIDEOLARYNGOSKOPU**)

- 25.3. v kontaktu při **VYSOKÉ DÁVCE** sedace k toleranci OTK (SUFNT 50ug/h + Propofol 500mg/h)
- **autoextubace OTI**
- **reintubace neúspěšná** (**NEDOSTUPNOST VIDEOLARYNGOSKOPU**)
- při progredující desaturaci **BACT** se zavedením OTK 6,5
- během výkonu hypoxická zástava, **KPR**, **ROSC 3 min**, s rychlou úpravou oxygenace a metabolických parametrů (max. laktát 2,8mmol/l).

RES UP KARIM



VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ
NEMOCNICE V PRAZE





PAT a MAT

A JE TO





KARIM

1.LF UK A VFN V PRAZE

Děkuji za pozornost



1. LÉKAŘSKÁ
FAKULTA
Univerzita Karlova



VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ
NEMOCNICE V PRAZE