

HOJENÍ CHRONICKÉ RÁNY OD JIP PO DOMÁCÍ PÉČI

Interní gastroenterologická klinika – sestra specialista pro hojení chronických ran
Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, Brno, Česká republika

Kazuistika

Žena 77 let, přijata na kliniku **12/2018** pro rozvíjející se MODS při sepsi. Primární onemocnění Morbus Crohn. Opakované překlady z JIP na ORIM, nutná UPV, analgosedace, katecholaminy. Vznikl dekubitus IV. stupně v oblasti sacra s černou nekrózou zasahující ke kosti.

03/2019 na IGEK JIMP – ve spolupráci s KPRCH provedena chirurgická nekrektomie dekubitu, doporučen konzervativní postup. Intenzivní péče pod vedením lékařů, ve spolupráci se sestrami, fyzioterapeuty, nutričními terapeuty a konziliáři.

04/2019 spolupráce rozšířena o sestru pro hojení chronických ran – probíhá pravidelná fotodokumentace.

26. 4. První zdokumentovaná fotodokumentace

Vzhled rány - spodina čistá, granulující, okolí potřhané.

Cíl - zachovat spodinu čistou, podpora granulační fáze, podpora epitelizační fáze, ochrana okolí.



29.5. Propuštění pacientky na Doléčovací a rehabilitační oddělení

Vzhled rány - spodina čistá, granulace pokračuje, epitelizace postupuje, okolí klidné.

Cíl - zachovat spodinu čistou, podpora granulační fáze, podpora a ochrana epitelizační fáze, ochrana okolí.



03.6. Opakovaná hospitalizace

Vzhled rány - ulpívající biofilm na spodině, granulace pokračuje, větší epitelizace, macerované okolí.

Cíl - odstranit biofilm na spodině, podpora granulační fáze, podpora a ochrana epitelizační fáze, péče o okolí - spolupráce s kožním lékařem.



04.07. Alternativní metoda sekundárního krytí

Cíl - zvýšená péče o okolí rány, alternativní sekundární krytí pro intoleranci náplasti.



21.8. Propuštění pacientky na Doléčovací a rehabilitační oddělení

Vzhled rány - spodina čistá, granulace pokračuje, epitelizace postupuje, okolí klidné, rána plošně i hloubkově zmenšena.

Cíl - zachovat spodinu čistou, podpora granulační fáze, podpora a ochrana epitelizační fáze, ochrana okolí.



10.9. Opakovaná hospitalizace

Vzhled rány - spodina čistá, granulace pokračuje, epitelizace postupuje, objevuje se nový kožní kryt od okrajů rány, okolí macerované a potřhané.

Cíl - zachovat spodinu čistou, podpora granulační fáze, podpora a ochrana epitelizační fáze, ochrana nového kožního krytu, péče o okolí - spolupráce s kožním lékařem.



7.10. Propuštění pacientky do domácí péče.

Vzhled rány - spodina čistá, klidná, rána celkově zmenšena, epitelizace pokračuje, okolí klidné.

Cíl - zachovat spodinu čistou, podpora a ochrana epitelizační fáze, ochrana nového kožního krytu, péče o okolí. Pacientka edukována, zajištěna spolupráce s agenturou domácí péče a pomůcky.



4.11. Ambulantní kontrola v nutriční poradně.

Vzhled rány – ulpívající biofilm na spodině, epitelizace postupuje, rána se zatahuje, okolí klidné.

Cíl - odstranit biofilm na spodině, podpora a ochrana epitelizační fáze, ochrana nového kožního krytu, péče o okolí. Pacientka ošetřována sestrami z Agentury domácí péče.



ZÁVĚR

Hojení chronických ran závisí na kontinuitě péče, spolupráci multidisciplinárního týmu v čele s ošetřujícími lékaři, sestrami, konziliáři, nutričními terapeuty, fyzioterapeuty, sestrou specialista pro hojení chronických ran, sester agentury domácí péče a především na důsledné edukaci a spolupráci pacienta. Při úspěšném hojení chronických ran je nezbytné respektování a podpora jednotlivých fází hojení ran pomocí principů vlhké terapie.