



JAK VEDU POROD

Mgr. Alžběta Němcová



CO PRO MĚ HRAJE ROLI PŘI VEDENÍ PORODU

- SOUKROMÍ
- INFORMOVÁNÍ
- TRPĚLIVOST
- NULIPARA VS
MULTIPARA

CO JE ZÁSADNÍ

- INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP
- SPOLUPRÁCE: žena s PA, PA s lékaři
- ZAJIŠTĚNÍ MINIMÁLNÍHO RIZIKA PRO MATKU A DÍTĚ
- NASTAVENÍ A PSYCHIKA ŽENY

ČASTÉ PŘEDSTAVY A PŘÁNÍ ŽEN O PRŮBĚHU PORODU

- RYCHLÝ
- MINIMÁLNĚ BOLESTIVÝ
- PŘIROZENÝ = BEZ
ZÁSAHU
- PORODNICKÁ
ANALGEZIE = SELHÁNÍ





INDUKOVANÝ POROD

- VÍCE BOLESTIVÉ, Z POČÁTKU NEEFEKTIVNÍ KONTRAKCE, BEZ VLIVU NA PROGRESI VAGINÁLNÍHO NÁLEZU
- ŽENA JE HOSPITALIZOVÁNA
- INDUKCE MŮŽE PROBÍHAT AŽ 3 DNY
- PORODNÍ CESTY VĚTŠINOU NEJSOU PŘI ZAHÁJENÍ INDUKCE VHODNĚ PŘIPRAVENY


Induction of Labour





ÚNAVA

- U PRVORODIČEK 1 CM – HODINA
- MOŽNOST POSLÍČKŮ NĚKOLIK DNŮ PŘEDEM
- VYČERPÁVAJÍCÍ





KDY PŘISTUJUJI K PORODNICKÉ ANALGEZII?

1. PŘÁNÍ RODIČKY
2. DOPORUČENÍ – INFORMOVÁNÍ
3. MOŽNOSTI
 1. Epidurální analgezie
 2. Nalbuphin
 3. Actynox
 4. Remifentanil

MOJE METODA PRVNÍ VOLBY

EPIDURÁLNÍ ANALGEZIE

(POKUD NENÍ KONTRAINDIKACE)



OBAVY RODIČEK

- NEBEZPEČNÉ
- BOLESTIVÁ APLIKACE
- PŘIPOUTÁNÍ K POSTELI
- ŠPATNÁ MOBILITA, NEMOŽNOST CHŮZE
- NEMOŽNOST VYUŽITÍ SPRCHY

DOPORUČENÍ K APLIKACI EPIDURÁLNÍ ANALGEZII

1. SPASMUS NEBOLI “KROUCENÍ“
2. INDUKCE PORODU
3. VYČERPANÁ RODIČKA
4. SUSPEKTNÍ CTG
5. ZKALENÁ VODA PLODOVÁ
6. A další

VHODNÝ NÁLEZ PRO APLIKACI

- VAGINÁLNÍ NÁLEZ –
BRANKA 4cm
- PRAVIDELNÁ DĚLOŽNÍ
ČINNOST
- V PŘÍPADĚ ZACHOVALÉ
VODY PLODOVÉ, PŘED
DVB



INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

NENÍ NÁLEZ, KDY NELZE APLIKOVAT EPIDURÁLNÍ ANALGEZII

Výjimka: kontraindikace k epidurální analgezii





SPASMUS NEBOLI „KROUCENÍ“

- VELMI ČASTO INDUKOVANÉ
PORODY NEBO PORODY,
KTERÉ TRVAJÍ DLOUHO





JAK MŮŽE EPIDURÁLNÍ ANALGEZIE POMOCI?

- ÚLEVA OD BOLESTI
- RELAXACE PÁNEVNÍCH SVALŮ
- MOŽNOST ODPOČINKU RODIČKY A ZLEPŠENÍ JEJÍ PSYCHICKÉ POHODY
- RYCHLEJŠÍ PROGRESE VAGINÁLNÍHO NÁLEZU
- RYCHLEJŠÍ PRŮBĚH PORODU
- MOBILITA RODIČKY
- ZLEPŠENÍ UTEROPLACENTÁRNÍ PERFUZE



APLIKACE PŘI SUSPEKTNÍM CTG ČI ZKALENÉ VODĚ PLODOVÉ

- SPASMOLYTICKÝ EFEKT – RELAXACE PÁNEVNÍCH SVALŮ A UVOLNĚNÍ PORODNÍCH CEST -> MOŽNÁ ÚPRAVA CTG
- PREVENCE PROTRAHOVANÉHO PORODU
- EVENT. VYUŽITÍ PŘI S.C.



DĚKUJI ZA POZORNOST