

# ISCHEMIE MYOKARDU

## PŘÍZNAKY

Uvažuj o ischemii myokardu jestliže:

1. Je-li přítomna deprese nebo elevace **ST segmentu**
2. Jsou-li přítomny **arytmie**: poruchy vedení, **nevysvětlené tachykardie, bradykardie nebo hypotenze**
3. Abnormality regionální funkce stěn a/nebo zhoršení mitrální regurgitace pomocí jícnového echa
4. U **pacienta při vědomí**: stenokardie atd.

**PŘIVOLEJ POMOC!**



**INFORMUJ TÝM!**

## LÉČBA

1. Zvyš frakci **O<sub>2</sub>** na **100%** při vysokém průtoku
2. Verifikuj ischemii (12ti svodové EKG)
3. Léčba **hypotenze** nebo hypertenze
4. **Betablokátory** pro zpomalení srdeční frekvence  
Pozastav v případě bradykardie nebo hypotenze
5. Zvaž podání kys. acetylsalicylové po nebo NGS/OGS, ev. i.v. (Aspegic)
6. Konzultuj kardiologa (ev. invazivní intervence)
7. Léčba bolesti **opioidy** (Fentanyl, Morphin)
8. Zvaž infuzi **nitroglycerinu** (pokud **není** léčena hypotenze)
9. Zaveď **invazivní měření art. tlaku**
10. Odešli laboratoř: ABR, KO, Troponin
11. V případě **anemie** podej erymasu
12. Zvaž **jícnové echo** ke zhodnocení srdeční náplně a poruch kinetiky myokardu
13. Zvaž zavedení CŽK
14. V případě hemodynamické nestability zvaž **intraaortální balonkovou kontrapulzaci, ev. jinou podporu srdeční**
15. Buď připraven na možný vznik **arytmií**