


## Kontrolní protokol po regionální nebo centrální blokádě

Protokol prosím nezakládat do dokumentace, poslat na KDAR po 48 hod (pokud zůstane v dokumentaci)

Štítek pacienta  	Hmotnost: .....kg      Datum: .....  Operační dg.: .....  Výkon:.....  Lékař provádějící blokádu: .....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**CENTRÁLNÍ BLOKÁDA**      čas provedení: \_\_:\_\_\*

Epidurální  L /  Th /  nebo kaudální

Jehla ..... G      Provedeno v CA      ano       ne

Katetr      ano  ..... G      ne       detekce :      ztrátou odporu       kapkou

Hloubka katetru v epi ..... cm      EPI prostor detekován v ..... cm

Dávka ..... ml      ..... % .....

Tunelizace      ano  .....cm      ne

Komplikace      ano  jaké: .....      ne

**PERIFERNÍ BLOKÁDA**      čas provedení: \_\_:\_\_\*

Horní končetina: .....      UZ:      ano       ne

Dolní končetina: .....      UZ:      ano       ne

Stimulace:      ano       ne       Jehla:      tupá       ostrá       provedeno v CA      ano       ne

Jiné:.....

Dávka ..... ml      ..... % .....

Komplikace      ano  jaké: .....      ne

**NÁSLEDNÁ KONTROLA:**

**Hodnocení po příjezdu** na dospávací pokoj/odd/JIP: \_\_:\_\_\*      FLACC:  / VAS:

**60 minut** po prvním hodnocení: \_\_:\_\_\*      FLACC:  / VAS:

**4 hodiny** po prvním hodnocení: \_\_:\_\_\*      FLACC:  / VAS:

Čas :  a hodnota FLACC:  / VAS: , kdy bylo nutné podat **první** doplňkové analgetikum.

Analgetikum: .....      Dávka: .....      Forma podání (i.v. / i.m. / s.c. / p.o / p.r.): .....

Parestezie:      ano       ne       Paréza:      ano       ne

**Druhý den po výkonu:**

Nauzea:      ano       ne       Zvracení:      ano       ne

Trvání analgezie blokádou: (při jednorázové aplikaci) ..... hod

**Další analgetika v průběhu 24 hod:** .....      čas: \_\_:\_\_\*

.....      čas: \_\_:\_\_\*,      .....      čas: \_\_:\_\_\*

Katetr extrahován: datum/kým .....      Podpis a razítko lékaře

: Vyplňuje sestra DP/odd/JIP

\* čas ve formátu hh:mm \_\_:\_\_ (přesné časy budou předepsány na operačním sále)

# SKÓROVACÍ SYSTÉMY

## Obličejová škála bolesti = VAS



**0**

Nebolí



**2**

Bolí  
trošku



**4**

Bolí  
trochu víc



**6**

Bolí  
ještě víc



**8**

Bolí  
moc



**10**

Bolí  
nejvíc

**Hodnocení:** 4 a více bodů = bolest a nutná intervence

## FLACC skóre 0 – 7let (nebo bez schopnosti reagovat na „obličej“)

Kategorie	Popis	Skóre
Obličej	žádný určitý výraz nebo úsměv	0
	příležitostná grimasa nebo zamračený obličej	1
	často nebo neustále se třesoucí brada, sevřené čelisti	2
Činnost nohou	normální poloha nebo uvolněné	0
	neklidné, nepokojné, napětí	1
	kopání nebo mávání nohama	2
Aktivita	leží v klidu, v běžné poloze, uvolněně se pohybuje	0
	napjatý, krotí se, posouvá se vzad a vpřed	1
	napjatý, ztuhlý nebo s sebou hází	2
Pláč	nepláče (spí nebo je vzhůru)	0
	naříká, sténá, příležitostné stěžování	1
	vytrvalý pláč, křik nebo vzlykání, časté stěžování	2
Utišitelnost	spokojený, uvolněný	0
	uklidní se dotykem, pohlazením nebo slovně, dá se odvést pozornost	1
	lze jen obtížně utěšit nebo uklidnit	2

**POZN.:** Hodnotit prosím obě skóre, pokud pac. není schopen vyhodnotit „obličej“, tak jen FLACC

Interpretace FLACC:

4-6b – neopioidní analgezie (paracetamol, novalgin, nurofen...)

7-10b – kombinovaná analgezie (opioidní + neopioidní)

Pokud při analgetizaci do epidurálního katetru v kombinaci s neopioidními analgetiky přetrvává hodnota

VAS/FLACC **skóre nad 6** kontaktujte KDAR na kl. **4404**.