

PERMCATH POHLEDEM SESTRY

Mgr. Lenka Frodlová, Interní gastroenterologická klinika, Hemodialyzační středisko

Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, Brno, Česká republika

PermCath (permanentní katétr) je jeden z cévních přístupů pro hemodialyzační terapii. Jedná se o katétr, který je chirurgickým zákrokem (vpichem do podkoží s vytvořením tzv. tunelu) a pod UZ kontrolou zaveden do centrálního řečiště pacienta. Nejčastější přístup je v. jugularis interna, případně v. femoralis.

Speciální dakronová manžeta, která vrostle do podkoží, zajišťuje fixaci a brání vstupu infekce.

Po zavedení následuje i RTG kontrola správné pozice PermCathu.

Nutná edukace pacienta před samotným zajištěním cévního přístupu! Po zavedení pravidelné aseptické převazy sestrou dialyzačního střediska.

| Cévní přístup | Počet | Procenta |
|----------------|-------|----------|
| PermCath | 18 | 21.4% |
| AVF | 60 | 71.4% |
| PermCath + AVF | 5 | 6.0% |
| AVG | 1 | 1.2% |

Tab. 1 Poměr cévních přístupů na HDS FN Brno-Bohunice k 01.10.2019, celkový počet pacientů 84



Obr. 1 Pomůcky k převazu, CAVE: alergie!



Obr. 2 Pomůcky potřebné k péči o PermCath po ukončení jednotlivé dialyzační terapie.



Obr. 3 Dostatek materiálu na jednom místě a vždy při ruce.



Obr. 4 Viditelné označení množství zátky na lumen PermCathu.



Obr. 5 PermCath po ukončení jednotlivé dialyzační terapie, ochranné pouzdro.