

DOMÁCÍ PARENTERÁLNÍ VÝŽIVA Z POHLEDU AMBULANTNÍ SESTRY

Eva Perleczká, DiS. Interní gastroenterologická klinika
Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, Brno, Česká republika

Parenterální výživa je běžně podávána v nemocničním prostředí. Z důvodů různých indikací (např. syndrom krátkého střeva) je nutné aplikovat parenterální výživu dlouhodobě a to několik měsíců až let. Parenterální výživu je možno aplikovat jak ve formě továrně vyráběných vaků a nebo AIO vaků a to za přísně aseptických podmínek připravovaných v ústavní lékárně a transportována pacientům do domácího prostředí.

Nejčastější cévní přístupy pro aplikaci parenterální výživy jsou Broviac katétr, PICC katétr a žilní porty. O jednotlivé cévní vstupy si pečují pacienti sami nebo docházejí do nutriční ambulance, která se specializuje na domácí parenterální výživu a nebo agentury domácí péče. Z velké části převažují továrně vyráběné vaky a asi 22 % jsou vaky připravené ústavní lékárnou.

Náplň sestry pracující v nutriční ambulanci se zaměřením na domácí parenterální výživu je kromě standardních kontrol v ambulanci, edukace nových pacientů seznamující se parenterální výživou, převazy jednotlivých cévních vstupů jak hospitalizovaných, tak docházejících z domácího prostředí.

Podávání vaků v domácím prostředí lze aplikovat mobilní parenterální pumpou a nebo infuzním setem s regulačním kolečkem. V současné době je v péči nutriční ambulance 65 pacientů s domácí parenterální výživou.




Obr. 1 AIO vak připravován v lékárně




Obr. 2 Továrně připravovaná vak

Cévní přístupy



Výživové vaky



Způsob podávání

