

Využití regionální anestézie k osteosyntéze pertrochanterické zlomeniny stehenní kosti u vysoce rizikového pacienta - kazuistika

I. Kříkava¹, T. Brychta², M. Tesák²

¹KARIM, Fakultní nemocnice Brno, Česká republika, ²IKK, Fakultní nemocnice Brno, Česká republika
V září roku 2006 byl v naší nemocnici hospitalizován 46-letý pacient s pertrochanterickou zlomeninou stehenní kosti. Poměrně běžný úrazový stav značně komplikovala vrozená srdeční vada, s výrazně rozvinutou symptomatologií. Jednalo se o komplexní cyanotickou vadu s jednodukorovou cirkulací po paliativním výkonu před 3 lety. Pro výrazné prodloužení koagulačních časů nebylo možné použití neuroaxiálních blokády. S ohledem na požadavek dobré oběhové stability pacienta jsme zvolili kombinaci blokády n.ischiadicus a blokády psoatového kompartmentu. Provedení regionální blokády bylo komplikováno výsevem exantému, který ovšem po nasazené terapii zmizel a další průběh výkonu byl již bez komplikací. Po výkonu byl pacient předán do péče interní kardiologické kliniky. Další hospitalizace a rehabilitace probíhala bez pozoruhodností.

V prezentaci je zmíněno použití technik regionální anestezie u pacienta se závažným komplikujícím onemocněním jako metoda první volby.