

Kmenová CMP.. ...a nebo je vše jinak?

- Märzová D., Čech J., Kos Z.

Klinické příznaky

- vertigo
- centrální vestibulární syndrom, dysartrie, diplopie, končetinová ataxie, porucha čítí obličeje
- porucha vědomí

Kazuistika 1

- 72 letá žena s anamnézou iCMP v zadním povodí (ataxie, vomitus, zrakové halucinace) 2015
- přivezena na Emergency po kolapsu, během transportu fluktuující vědomí
- po předání:
 - jednoslovné odpovědi
 - rozvoj neklidu a myoklonií
 - kolísavé vědomí (GCS 13..12)
- CT mozku + CT AG EC a IC tepen - bez průkazu recentních změn ve srovnání s 2015

Kazuistika 1

- náhle progresivní porucha vědomí, GCS 5, izokorické zornice, záškuby končetin na algický podnět
- OTI/UPV a podání IVT (110 minut od “kolapsu”)
- NGS se zbytky jídla
- pohovor s rodinou
 -okrajová informace o konzumaci hub ze zahrady





- odeslán vzorek na toxikologické vyšetření a konzultace Toxikologického centra
- suspekce na otravu muchomůrkou tygrovanou - *Amanita pantherina*
- extubace za 36 hodin ... intaktní neurologický náález

Kazuistika 2

- 64 letá žena odeslána k neurologickému vyšetření z jiné nemocnice
- nevolnost, nausea, sakadovaná řeč, svalové záškuby, vertigo ... samotnou pacientkou hodnoceno jako “stav opilosti”
- v neurologickém obraze:
 - vestibulo - mozečková sympt.
 - porucha řeči



Kazuistika 2

- CT mozku + CT AG EC + IC tepen - bez zásadního nálezu
- indikace k IVT
- po 15 minutách od ukončení rozvoj otoku jazyka a rtů

Kazuistika 2

- po zalečení angioneurotického edému info od pacientky stran požití řízku z hub od sousedky 40 minut před vznikem obtíží
- žaludeční obsah nezískán
- klinicky vysoká suspekce na otravu muchomůrkou tygrovanou



autor: Meryta

toprecepty.cz

Klinické příznaky otravy muchomůrkou tygrovanou

- nevolnost, zvracení, bolest hlavy, vertigo, končetinová ataxie, dysartrie
- hyperkinetické chování, myoklony, halucinace...



Děkuji za pozornost

