

EMBOLIE PLODOVOU VODOU

PŘÍZNAKY

O embolii plodovou vodou uvažuj v případě náhlého rozvoje následujících příznaků u těhotné či pacientky těsně po porodu:

1. dechová tíseň, pokles sat. O₂
2. oběhová nestabilita – hypotenze, tachykardie, arytmie, srdeční zástava
3. koagulopatie +/- DIC
4. křeče
5. alterace vědomí
6. jinak nevysvětlitelná tíseň plodu

PŘIVOLEJ POMOC!



INFORMUJ TÝM!

OKAMŽITÁ OPATŘENÍ

1. Předpokládej možnost **srdeční zástavy** a ukonči těhotenství provedením **emergentní SC**
2. Poloha pacientky na **levém** boku
3. Podej **100% O₂** o vysokém průtoku
4. Zaveď vysokoobjemový **žilní vstup** (lépe v horní části těla)
5. Podpora oběhu **tekutinami i.v.** (objemová resuscitace), **vazopresory, inotropiky**
6. **Připrav se na emergentní intubaci**
7. Pokud je to možné zaveď arteriální vstup, kanyluj CŽK případně zaveďte i.o. vstup do humeru
8. Očekávej **masivní krevní ztráty** a rozvoj DIC – postupuj dle protokolu “Masivní krvácení (ŽOK)”
9. Zvaž **oběhovou (orgánovou) podporu** - konzultuj kardiologa

DIF. DG.

Vyluč jiné možné příčiny, které mají podobné projevy:

1. eklampsie
2. krvácení
3. vzduchová embolie
4. aspirace
5. anafylaxe
6. plicní embolie
7. předávkování anestetiky
8. sepse
9. kardiomyopatie, chlopenní vady, AIM
10. alergická reakce na lokální anestetikum