

# TOTÁLNÍ SPINÁLNÍ ANESTEZIE

## PŘÍZNAKY

### PO NEUROAXIÁLNÍ BLOKÁDĚ

1. Nečkaně rychlý vzestup senzoričké blokády
2. Mravenčení a slabost horních končetin (zkus sílu stisku ruky)
3. Dyspnoe
4. Bradykardie
5. Hypotenze (nebo nauzea/zvracení)
6. Ztráta vědomí
7. Apnea
8. Srdeční zástava

**Při srdeční zástavě: zahaj KPR, okamžitě Adrenalin, pokračuj jako při “Bezpuľzové zástavě”**

**PŘIVOLEJ POMOC!**



**INFORMUJ TÝM!**

## LÉČBA

1. Podpora **ventilace**, pokud je nutné, intubuj
2. Léčbu těžké bradykardie okamžitě zahaj **adrenalinem** (začni 10 - 100 µg, zvyšuj dle potřeby, **pokračuj** dle příslušné události).  
Při mírné bradykardii zvaž **atropin** (0,5 -1 mg), ale je-li třeba, přikroč rychle k adrenalinu.
3. Podej **bolus tekutin i.v.**
4. Jde-li o **rodičku**, volej porodníka a neonatologa, připrav se na možný urgentní **císařský řez**, poloha na levém boku, monitoruj fetální srdeční akci