

Proč se opakovat? Protože opakování je matka moudrosti a zručnosti!

MUDr. Michal Otáhal

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
1. lékařská fakulta UK a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
U nemocnice 2; 128 08 Praha 2
www.karim-vfn.cz





Pavel Herda

Sdíleno veřejně - 14. 4. 2014

Se všemi , kdo chtějí opravdově a plnohodnotně žít a naplnit slovo život a hledají na to recept , jako my vsichni, se chci podělit o jeden důležitý . Jsou náhody , které přináší poznání . Jsou to náhody? :-)))

Proč se opakovat?

Protože opakování je matka moudrosti a zručnosti!

**A až to VŠICHNI BUDOU UMĚT jako my
TAK my s tím MUŽEME PŘESTAT**


Anamnéza

- ročník 83
- juvenilní revmatoidní arthritida, polyartikulární forma
- sek. Coxartroza
- s omezenou hybností C páteře,
- morbidně obézní s BMI 46
- přijata k **plánované SC v termínu**
- **Mallampati 2**



Anamnéza

- s omezenou hybností C páteře, morbidně obézní s BMI 46



Selhání svodné - > CA

- **24.6. 2015** pokus o svodnou anestezii neúspěšný
- **proto zvolena CA**
- neúspěšná OTI, pokus s buží selhal, **zavedena LMA**, vybaveno dítě (2620,47cm, Apg.10/10/10)
- následně nárůst tlaků v DC, další pokus o **OTI neúsp., zaveden Fast-trach č.3, SpO2 kolísá 60-88%**, rozvoj hypertenze, tachykardie
- v době 9:05h až 10:13h opakovaně **hypoxická zástava s KPR celkem 4x**, přechodně snad ROSC
- v **9:50 kontaktován team RES UP KARIM** s žádostí o videolaryngoskop a pomoc při zajištění DC, údajně SpO2 50%, údajně KPR cca 10-15min.



Zajištění DC

- cca v 10:05-10:10 team KARIM (Dr. Herda+Dr.Otáhal) dorazil na sál
- pacientka ventilována přes **Fast-trach**
SpO2 69% na 1,0 FiO2, TK 150/100, SR tachy 140/min
- **široké mydriatické zornice bez fotoreakce**
- referováno podání 14mg Adrenalinu, NaHCO3 200ml
- cyanoza, masivní plicní edém
- pokus o intubaci **videolaryngoskopem** selhal pro otok tkání a masivní plicní edém zcela znepřehledňující DC
- proto přechodně opět Fast-trach

Koniotomie - > BACT (CO-BACT)


- **provedena koniostomie** setem (4mm kanyla),
přechodně SpO2 100%
- pro plicní edém **konverze na BACT = CO-BACT**
přes zavaděč zavedena zkrácená kanyla č. 6,5
- ventilace s nutností vysokých inspir. tlaků, SpO2 100-70% na
FiO2 1,0
- orientační TTE bez PNO, dobrá fce LK, štíhlá PK
- přechodně epizoda cca 4min KPR při VF, Adrenalin 2mg,
NaHCO3 100ml, následně SR tachy 130/min, TK 140/100,
sedace, terapeutická hypotermie
- pro venozní krvácení z koniotomie tato rozšířena, ošetřeno
opichem a elektrokoagulací

RES UP KARIM



Neurologický outcome

- postupně regrese mydriázy na 4-/4- i přes hlubokou



- 16.7.15 EEG + konz.: Post-ischemická encefalopatie s odpovídajícím EEG korelátem, t.č. klinicky odpovídá apalickému syndromu - v EEG faktory nepříznivé prognosy. Celkově pravděpodobnost obnovení vědomí vedoucí k kvalitnímu životu je velmi nízká
- 11/2016 trvá apalický stav, hospitalizovaná na DIOP

UŽ ŽÁDNÁ HYPOXICKÁ ZÁSTAVA





KARIM

1.LF UK A VFN V PRAZE

Děkuji za pozornost

