

Intoxikace psychoaktivními látkami a poruchy chování u pacientů v nemocniční péči



Krajská nemocnice Liberec, a.s.
nemocnice Liberec nemocnice Turnov


Pělucha Robin bdb., zp.
Centrum psychiatrie
Krajská nemocnice Liberec a.s.

Porucha chování → agrese

- Při stabilizovaném somatickém stavu transport na Záchytnou stanici (indikace)
- Anamnéza
- Klinický obraz
- Multidrug BS screen
+ altest
→ **diagnóza**



- Ženy alkohol/drogy/kombi – 154/26/9
- Muži alkohol/drogy/kombi - 542/77/8



- 1.nefarmkologický postup
 - deescalace násilí: vyhodnocení/správná komunikace/vyjednávání
 - fyzické omezení
- 2.farmakologický postup



ALKOHOL

- Haloperidol 2.5-5mg i.m
NÚ: dystonie, epi, QTc
- Tiaprid
- CAVE: beznodiazepiny



BUDIVÉ AMINY

- Benzodiazepiny

Diazepam 5-10mg p.o./i.v.

X


Clonazepam 1mg i.m.

- CAVE – antipsychotika
(arytmie)




MARIHUANA


- Benzodiazepiny / antipsychotika (haloperidol, levomepromazin)
- Dle dominantních symptomů
- Syntetické THC, HHC, geneticky modifikované
- Legalizace?



NOVINKY

- HHC + syntetické kanabinoidy
- Designer drugs – A. Shulgin
- Ketamin
- Fentanyl a alternativy opiátu
- Tekutá extáze (GHB) – chemsex
- Kratom





Děkuji za pozornost

Zdroje: Psychiatrie pro praxi, Zvládání agitovanosti a násilného chování, doc.MUDr.Jan Vevera, MUDr.Martin Černý

www.akutne.cz, MUDr. Hýža Martin, Postupy v nejčastějších akutních stavech v psychiatrii