

Zkušenosti sester s participací rodinných příslušníků na péči o pacienty v intenzivní péči

Ondřej Otruba, Veronika Otrubová, Simona Saibertová


Katedra zdravotnických věd, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Česká republika

Úvod: Hospitalizace na jednotce intenzivní péče (JIP) je nesmírně náročnou zkušeností, nejen pro pacienty, ale také pro jejich rodinné příslušníky, kteří se snaží udržet kontakt s pacientem. V současnosti se stále více výzkumů zaměřuje na zkoumání negativního dopadu hospitalizace na JIP z pohledu jak pacientů, tak jejich rodin. ¹


Cíl: Zjistit, jaké jsou zkušenosti a názory sester na účast rodinných příslušníků pacientů na jednotkách intenzivní péče.

Metody: Online dotazníkové šetření. Studie byla provedena u všeobecných sester pracujících na jednotce intenzivní péče, všechny měly zkušenosti s účastí rodinných příslušníků na péči o pacienty. Sestry subjektivně hodnotily názory a zkušenosti s účastí rodinných příslušníků na péči o pacienty na JIP pomocí Likertovy škály. Statistická validace byla provedena pomocí ANOVA testu s hladinou významnosti 0,05.


Používání participace




Zkušenosti s participací



Myšlenka participace přišla od









Reakce rodinných příslušníků na možnost participace



Výsledky: Do průzkumu se zapojilo celkem 171 všeobecných sester (90,6 % žen a 9,4 % mužů). Sestry ve věkové skupině 50-59 let vykazovaly nejvyšší úroveň zkušeností s účastí rodinných příslušníků, zejména v oblasti hygieny ($p=0,001$), zatímco ty ve věku 40-49 let měly větší zapojení při bazální stimulaci ($p=0,001$), psychologické podpoře pacienta ($p=0,001$) a polohování ($p=0,004$). Ostatní pracovní a demografické charakteristiky, jako je pohlaví, délka praxe nebo typ oddělení, nevykazovaly významné rozdíly. Bylo pozorováno převažující pozitivní mínění ohledně využívání účasti rodinných příslušníků v péči o pacienta ($p=0,002$), potřeby zavádění standardizovaných postupů do praxe ($p=0,002$) a zájmu sester o problematiku účasti rodinných příslušníků ($p=0,003$).

Subjektivní hodnocení sester při zapojení rodinných příslušníků do jednotlivých oblastí péče o pacienta



Závěr: Studie odhalila, že sestry vnímají zapojení rodin pacientů do péče o ně jako důležité a prospěšné. Jako hlavní překážky účasti identifikovaly vzdělávání členů rodiny v péči o pacienta a nepohodlí spojené s přítomností cizí osoby na pracovišti.

Zdroj: 1. Mackintosh N, Davis R, Easter A, Rayment-Jones H, Sevdalis N, Wilson S et al. Interventions to increase patient and family involvement in escalation of care for acute life-threatening illness in community health and hospital settings. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2017; 10.