


Kontrolní protokol po regionální nebo centrální blokádě

Protokol prosím nezakládat do dokumentace, poslat na KDAR po 48 hod (pokud zůstane v dokumentaci)

| | |
|--|---|
| Štítek pacienta  | Hmotnost:kg Datum: Operační dg.: Výkon:..... Lékař provádějící blokádu: |
|--|---|

CENTRÁLNÍ BLOKÁDA čas provedení: __:__*

Epidurální L / Th / nebo kaudální

Jehla G Provedeno v CA ano ne

Katetr ano G ne detekce : ztrátou odporu kapkou

Hloubka katetru v epi cm EPI prostor detekován v cm

Dávka ml %

Tunelizace ano cm ne

Komplikace ano jaké: ne

PERIFERNÍ BLOKÁDA čas provedení: __:__*

Horní končetina: UZ: ano ne

Dolní končetina: UZ: ano ne

Stimulace: ano ne Jehla: tupá ostrá provedeno v CA ano ne

Jiné:.....

Dávka ml %

Komplikace ano jaké: ne

NÁSLEDNÁ KONTROLA:

Hodnocení po příjezdu na dospávací pokoj/odd/JIP: __:__ * **FLACC:** / **VAS:**

60 minut po prvním hodnocení: __:__ * **FLACC:** / **VAS:**

4 hodiny po prvním hodnocení: __:__ * **FLACC:** / **VAS:**

Čas : a hodnota FLACC: / VAS: , kdy bylo nutné podat **první** doplňkové analgetikum.

Analgetikum: Dávka: Forma podání (i.v. / i.m. / s.c. / p.o / p.r.):

Parestezie: ano ne Paréza: ano ne

Druhý den po výkonu:

Nauzea: ano ne Zvracení: ano ne

Trvání analgezie blokádou: (při jednorázové aplikaci) hod

Další analgetika v průběhu 24 hod: čas: __:__*

..... čas: __:__*, čas: __:__*

Katetr extrahován: datum/kým Podpis a razítko lékaře

: Vyplňuje sestra DP/odd/JIP

* čas ve formátu hh:mm __:__ (přesné časy budou předepsány na operačním sále)

SKÓROVACÍ SYSTÉMY

Obličejová škála bolesti = VAS



0

Nebolí



2

Bolí
trošku



4

Bolí
trochu víc



6

Bolí
ještě víc



8

Bolí
moc



10

Bolí
nejvíc

Hodnocení: 4 a více bodů = bolest a nutná intervence

FLACC skóre 0 – 7let (nebo bez schopnosti reagovat na „obličej“)

| Kategorie | Popis | Skóre |
|------------------|--|-------|
| Obličej | žádný určitý výraz nebo úsměv | 0 |
| | příležitostná grimasa nebo zamračený obličej | 1 |
| | často nebo neustále se třesoucí brada, sevřené čelisti | 2 |
| Činnost nohou | normální poloha nebo uvolněné | 0 |
| | neklidné, nepokojné, napětí | 1 |
| | kopání nebo mávání nohama | 2 |
| Aktivita | leží v klidu, v běžné poloze, uvolněně se pohybuje | 0 |
| | napjatý, krotit se, posouvá se vzad a vpřed | 1 |
| | napjatý, ztuhlý nebo s sebou hází | 2 |
| Pláč | nepláče (spí nebo je vzhůru) | 0 |
| | naříká, sténá, příležitostné stěžování | 1 |
| | vytrvalý pláč, křik nebo vzlykání, časté stěžování | 2 |
| Utišitelnost | spokojený, uvolněný | 0 |
| | uklidní se dotykem, pohlazením nebo slovně, dá se odvést pozornost | 1 |
| | lze jen obtížně utěšit nebo uklidnit | 2 |

POZN.: Hodnotit prosím obě skóre, pokud pac. není schopen vyhodnotit „obličej“, tak jen FLACC

Interpretace FLACC:

4-6b – neopioidní analgezie (paracetamol, novalgin, nurofen...)

7-10b – kombinovaná analgezie (opioidní + neopioidní)

Pokud při analgetizaci do epidurálního katetru v kombinaci s neopioidními analgetiky přetrvává hodnota

VAS/FLACC **skóre nad 6** kontaktujte KDAR na kl. **4404**.